



台灣家庭醫學醫學會

成人預防接種建議時程表 (2020~2021)



疫苗種類	年 齡	19-26 歲	27-49 歲	50-59 歲	60-64 歲	≥ 65 歲
白喉、百日咳、破傷風疫苗 (Td/Tdap)		每 10 年 Td 一劑，其中一劑 Td 以 Tdap 取代 ^{a, b}				
女性 ：人類乳突病毒疫苗 (HPV2 or HPV4 or HPV9)		3 劑 (0、2、6 月)				
男性 ：人類乳突病毒疫苗 (HPV4 or HPV9)		3 劑 (0、2、6 月)				
水痘疫苗 (Varicella)		2 劑 ^c 或補追加 1 劑				
帶狀疱疹疫苗 (Zoster)					1 劑	
麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗 (MMR)		2 劑 (0、1 月) 或補追加 1 劑				
流感疫苗 (Influenza)		每年 1 劑				
肺炎鏈球菌結合型疫苗 (Pneumococcal 13-valent conjugate, PCV13)					終身	1 劑 ^d
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (Pneumococcal polysaccharide, PPSV23)			1 或 2 劑 ^d			1 劑
A 型肝炎疫苗 (Hepatitis A)		2 劑 (0、6 月)				
B 型肝炎疫苗 (Hepatitis B)		3 劑 (0、1、6 月)				
日本腦炎疫苗 (Japanese encephalitis)		1 劑 或 3 劑 (0、1、12 月) ^e				

建議施打於該年齡層無相關病史、疫苗史或血清學免疫證據者；
 27-45 歲醫病共同決策施打；
 建議施打於該年齡層有危險因子者；
 無建議

- a. 可能接觸一歲以下嬰兒之 19-64 歲成人，可施打一劑 Tdap。如：
 (1) 產婦及其家屬 (2) 準備懷孕之婦女及其家屬 (3) 一歲以下嬰兒之親密接觸者與照護者
 (4) 所有過去未曾接種過 Tdap 且會直接照護病人之醫療工作者，特別是婦產科、小兒科、急診、
 坐月子中心及嬰幼兒托育機構之員工。
- b. 65 歲以上可能暴露到上述風險者，且未曾接種過 Tdap 者，宜接種一劑 Tdap。並建議每十年追加一劑 Td；惟宜依現有疫苗藥證規定補充說明。
- c. 依疫苗廠牌藥物仿單之建議時程施打
- d. PCV13 與 PPSV23 依國內 ACIP 建議之時程施打
- e. 1 劑：活性減毒疫苗；3 劑：不活化疫苗



備註：本表資料彙整國內、外 ACIP 建議之共識，各疫苗施打詳情敬請參照《家庭醫師與成人疫苗接種－臨床工作手冊第二版》內容