


# 成人預防接種建議時程表 (2018~2019)



疫苗種類	年齡	19-26歲	27-49歲	50-59歲	60-64歲	>=65歲
白喉、百日咳、破傷風疫苗 (Td/Tdap)		每 10年 Td 一劑，其中一劑 Td 以 Tdap 取代 <sup>a, b</sup>				
女性：人類乳突病毒疫苗 (HPV)		3 劑 (0、2、6月)				
水痘疫苗 (Varicella)		2 劑 <sup>c</sup> 或 補追加 1 劑				
帶狀疱疹疫苗 (Zoster)					1 劑	
麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗 (MMR)		2 劑 (0、1月) 或 補追加 1 劑				
流感疫苗 (Influenza)		每年 1 劑				
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (Pneumococcal polysaccharide, PPSV23)		1 或 2 劑 <sup>c</sup>				1 劑
肺炎鏈球菌結合型疫苗 (Pneumococcal 13-valent conjugate, PCV13)						終身 1 劑
A 型肝炎疫苗 (Hepatitis A)		2 劑 (0、6月)				
B 型肝炎疫苗 (Hepatitis B)		3 劑 (0、1、6月)				
日本腦炎疫苗 (Japanese encephalitis)		1 劑 或 3 劑 (0、1、12月) <sup>d</sup>				

   建議施打於該年齡層無相關病史、疫苗史或血清學免疫證據者；
    建議施打於該年齡層有危險因子者；
    無建議；

- a. 可能接觸一歲以下嬰兒之19-64歲成人，可施打一劑Tdap。如：
  - (1)產婦及其家屬
  - (2)準備懷孕之婦女及其家屬
  - (3)一歲以下嬰兒之親密接觸者與照護者
  - (4)所有過去未曾接種過Tdap且會直接照護病人之醫療工作者，特別是婦產科、小兒科、急診、坐月子中心及嬰幼兒托育機構之員工。
- b. 65歲以上可能暴露到上述風險者，且未曾接種過Tdap者，宜接種一劑Tdap。惟宜依現有疫苗藥證規定補充說明。
- c. 依疫苗廠牌藥物仿單之建議時程施打
- d. 1劑：活性減毒疫苗；3劑：不活化疫苗



備註：本表資料彙整國內外ACIP建議之共識，各疫苗施打詳情敬請參照《家庭醫師與成人疫苗接種－臨床工作手冊第二版》內容