



帶狀疱疹非活性重組疫苗 (Shingrix) 接種建議

疫苗種類	年齡	18-26 歲	27-49 歲	50-59 歲	60-64 歲	≥ 65 歲
帶狀疱疹非活性重組疫苗 (Recombinant Zoster Vaccine, RZV)		2 劑 (0、2-6 月)		2 劑 (0、2-6 月)		

 18 歲以上免疫不全或免疫功能低下者。

 建議施打於該年齡層無相關病史、疫苗史或血清學免疫證據者。

- 一、帶狀疱疹非活性重組疫苗疫苗 (recombinant zoster vaccine, RZV)，建議對象如下：
 - (一) 50 歲以上成人。
 - (二) 18 歲以上免疫不全或免疫功能低下者。
- 二、建議接種兩劑，兩劑間隔 2-6 個月。免疫功能缺乏、免疫功能受到抑制或因已知疾病或治療而可能使免疫功能受到抑制的人，第二劑可於第一劑施打 1 至 2 個月後施打。
- 三、曾經接種活性減毒帶狀疱疹疫苗 (live-attenuated zoster vaccine, LZV) 者至少 1 年後，可再接再種 RZV。
- 四、建議曾經罹患帶狀疱疹者可於發病 1 年且無相關症狀後，接種帶狀疱疹疫苗。

備註：本資料彙整國內、外 ACIP 建議之共識為主