



## 成人預防接種建議時程表 (2024)

疫苗種類 \ 年齡	19-26 歲	27-49 歲	50-59 歲	60-64 歲	≥ 65 歲
白喉、百日咳、破傷風疫苗 (Td/Tdap)	第一劑 Tdap, 每 10 年 Td 或 Tdap 一劑 <sup>a</sup>				
人類乳突病毒疫苗 (HPV9)	3 劑 ( 0、2、6 月 )				
水痘疫苗 (Varicella)	2 劑 <sup>b</sup> 或 補 追 加 1 劑 <sup>c</sup>				
帶狀疱疹減毒活性疫苗 (live-attenuated zoster vaccine, LZV)			1 劑		
帶狀疱疹非活性重組疫苗 (Recombinant Zoster Vaccine, RZV)	2 劑 ( 0、2 - 6 月 ) <sup>d</sup>				
麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗 (MMR)	2 劑 ( 0、1 月 ) 或 補 追 加 1 劑				
流感疫苗 (Influenza)	每 年 1 劑				
肺炎鏈球菌結合型疫苗 (PCV13, PCV15)					1 劑 <sup>e</sup>
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (PPSV23)	1 劑 或 2 劑 <sup>e</sup>				1 劑
A 型肝炎疫苗 (Hepatitis A)	2 劑 (0、6 月) <sup>b</sup>				
B 型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	3 劑 (0、1、6 月)				
日本腦炎疫苗 (Japanese encephalitis)	1 劑 <sup>f</sup>				
嚴重特殊傳染性 / 新冠肺炎疫苗 (COVID-19)	1 劑 <sup>g</sup>				

建議施打於該年齡層無相關病史、疫苗史或血清學免疫證據者；

27-45 歲醫病共同決策施打；

建議施打於該年齡層有危險因子者；

無建議

a. 每次妊娠後期，宜施打一劑 Tdap。

b. 依疫苗廠牌藥物仿單之建議時程施打。

c. 專家共識。

d. 曾經接種 LZV 或曾罹患帶狀疱疹者，若免疫不全者至少間隔八週後接種非活性重組疫苗，健康成人可間隔一年。

e. 未曾接種過，建議接種 PCV 劑型，至少 1 年後 (免疫不全者 8 週) 再接種 1 劑 PPSV23。先前僅接種過 PPSV23，至少 1 年後再接種 1 劑 PCV 劑型。接種過 PCV 劑型和 PPSV23 者，滿 65 歲後和上一劑 PPSV23 間隔至少 5 年再接種 1 劑 PPSV23。

f. 1 劑：台灣於 106 年 5 月 22 日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗。

g. 依據美國 ACIP 建議每年應至少施打一劑最新型疫苗。依疫情需求，配合台灣 CDC 政策實行。

備註：本表資料彙整國內、外 ACIP 建議之共識為主，各疫苗施打詳情可至疾病管制署全球資訊網 (<http://www.cdc.gov.tw>) 「預防接種」專區查詢。新舊疫苗交替之際，以國際現行之疫苗建議之。

