澄清綜合醫院　115 年 11 月 20 日繼續教育積分課程表

一、主辦單位:澄清綜合醫院

二、舉辦日期:115 年 11 月 20 日(星期五)

三、上課地點:澄清綜合醫院(平等)3F 第一會議室—台中市中區平等街 139 號

四、課程時數:共計 1 小時

五、對外開放網站：

1.澄清綜合醫院官方網站：https://pt.ccgh.com.tw/research_All20.htm

2.台中市醫師公會-學術演講會排程表：

https://www.tcmed.org.tw/article_d.php?lang=tw&tb=4&id=3228

時間	主題	講師
07:20-07:30	報到	
07:30-08:30	基層醫療常見感染症診斷及處置迷思	童綜合醫院/內科部主任暨感染科主治醫師-陳志銘主任
08:30	賦歸	

授 課 講 師 學 經 歷			
姓　名	陳志銘　醫師		
現職單位名稱	童綜合醫院	**職 稱**	內科部主任暨感染科主治醫師
專　長	蜂窩組織炎、泌尿道感染、梅毒、人類免疫不全病毒感染、骨髓炎、尋常疣、寄生蟲感染、流行感冒、不明原因發燒等		
學　經　歷	學歷： 教育部 部定副教授 國立中興大學 微生物學暨公共衛生學博士 中國醫藥大學 臨床醫學研究所碩士 中國醫藥大學 醫學士 現職： 健保局審核委員 感染管制查核委員 COVID-19 訪查委員 中國醫藥大學醫學系 國立中興大學(合聘)副教授 轉譯醫學研究所 兼任助理教授 部定副教授　仁德醫護管理專科學校 經歷： 童綜合醫院 內科部 主任 童綜合醫院 內科部感染科 主治醫師 中國醫藥大學附設醫院 感染科 主治醫師 中國醫藥大學附設醫院 感染科 研究醫師 教育部 部定副教授		
符合資格(勾選)	■(一)具有教育部審定講師級(含)以上資格者。 □(二)護理人員或其他領域枝講師，需具有政府核發枝專業證書(護理人員需為護理師)，並符合下列資格(1)碩士以上學歷，有三年(含)以上授課領域經歷；(2)大學學歷，有五年(含)以上授課領域經歷；(3)專科學歷，有七年(含)以上授課領域經歷。 ■(三)專科醫師領有證明文件者。 □(四)現(曾)任主管機關相關職務者。		
主辦單位	澄清綜合醫院 醫教室		
聯絡電話	04-24632000 轉 66822	**聯絡人**	黃琦雅
課程名稱（主題）：基層醫療常見感染症診斷及處置迷思 課程日期：115.11.20，課程時間：07：30~08：30 課程地點：澄清綜合醫院(平等)3F 第一會議室—台中市中區平等街 139 號			

【主題】

基層醫療常見感染症診斷及處置迷思

【摘要】

抗生素的不適當使用可能增加藥物副作用及抗藥性菌株感染風險，並增加醫療成本， 這次演講將討論於基層醫療中常見感染症診斷及治療上的迷思。

1. 小腿紅腫多數是蜂窩組織炎引起

事實：文獻報告提到，臨床上診斷的蜂窩組織炎約有 40%是其他診斷，最常見被誤認為蜂窩組織炎的疾病是 venous stasis dermatitis.

2. 尿液培養出≥10^5/mL 細菌，病人有泌尿道感染，需要治療。

事實：無症狀 bacteriuria 及 pyuria 以不同比例出現在各族群，並非罕見。診斷臨床 UTI 主要依據有無上、下泌尿道感染之症狀，而非尿液外觀、WBC 數量及細菌培養結果。

無症狀菌尿症，一定要治療的族群只有孕婦即將接受泌尿道手術病人

3. 對格蘭氏陽性球菌感染，vancomycin 是治療效果最好的藥。

事實：對 oxacillin-susceptible *Sta. aureus*，vancomycin 的治療效果明顯不如 oxacillin 或 cefazolin。對 ampicillin-susceptible Enterococcus spp. 研究結果顯示跟用 ampicillin 治療相比，vancomycin 的使用沒有額外好處。對 beta-lactam 敏感的 GPC，治療第一線藥物仍應以 beta-lactam 為主。

4. 一個病人 beta-lactam 藥物過敏，對其他 beta-lactam 藥物過敏機會很高。

事實：研究資料統計，病史上描述的 penicillin、cefazolin 過敏，90%病人經過仔細評估後可以移除過敏標籤。而且 beta-lactam 交互過敏反應主要是看 R1 side chain 的相近程度。Penicillin 類藥物的 R1 side chain 跟 cefazolin 不同，cefazolin 的 R1 side chain 也跟 ceftriaxone 或 cefepime 不同，當然也跟 carbapenem 不同，因此 penicillin 過敏病人還是可以開立 cefazolin 或 ceftriaxone。另外 IgE 相關過敏反應不是永久，會隨著時間而消失，10 年過後，80%病人的過敏反應不再存在。