



成人預防接種建議時程表 (2026)

疫苗種類	年 齡	19-26 歲	27-49 歲	50-59 歲	60-74 歲	≥ 75 歲
白喉、百日咳、破傷風疫苗 (Td/Tdap)		第一劑 Tdap, 每 10 年 Td 或 Tdap 一劑 ^a				
人類乳突病毒疫苗 (HPV9)		3 劑 (0、2、6 月)				
水痘疫苗 (Varicella)		2 劑 ^b 或 補追加 1 劑 ^c				
帶狀疱疹非活性重組疫苗 (Recombinant Zoster Vaccine, RZV)			2 劑 (0、2-6 月) ^d			
麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗 (MMR)		2 劑 (0、1 月) 或 補追加 1 劑				
流感疫苗 (Influenza)		每年 1 劑 ^e				
肺炎鏈球菌結合型疫苗 (PCV13, PCV15, PCV20, PCV21)			1 劑 ^{e f}			
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (PPV23)		1 劑 ^f			1 劑 ^f	
A 型肝炎疫苗 (Hepatitis A)		2 劑 (0、6 月) ^b				
B 型肝炎疫苗 (Hepatitis B)		3 劑 (0、1、6 月)				
日本腦炎疫苗 (Japanese encephalitis)		1 劑 ^g				
嚴重特殊傳染性 / 新冠肺炎疫苗 (COVID-19)		1 劑 ^e			1 劑 (≥ 65 歲) ^e	
呼吸道細胞融合病毒疫苗 (RSV Vaccine)		1 劑 (懷孕婦女 28-36 週)		1 劑		1 劑
流行性腦脊髓膜炎疫苗 B 型 (Meningococcal B vaccine)		2 劑 (0、1 月) ^e				
M 痘 (M pox)		2 劑 (0、1 月)				

■ 建議施打於該年齡層無相關病史、疫苗史或血清學免疫證據者；

■ 醫病共同決策施打 (HPV 27-45 歲)；

■ 建議施打於該年齡層有危險因子者；

□ 無建議

a. 每次妊娠後期，宜施打一劑 Tdap。

b. 依疫苗廠牌藥物仿單之建議時程施打。

c. 專家共識，然依據美國 ACIP 建議則為 1980 後出生者才需要考慮施打。

d. 曾經接種 LZV 或曾罹患帶狀疱疹者，若免疫不全者至少間隔八週後接種非活性重組疫苗，健康成人可間隔一年。

e. 依疫情需求，配合台灣 CDC 政策建議接種。

f. 依據 ACIP 建議自 2026 年起，未曾接種過，建議接種 PCV20 或 PCV21，先前接種 PCV13，至少 1 年後 (免疫不全者 8 週) 再接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。先前僅接種過 PPV23，至少 1 年後再接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。接種過 PCV13 和 PPV23 者，滿 65 歲後和上一劑 PPV23 間隔至少 5 年可再接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。

g. 依據美國 ACIP 建議每年應至少施打一劑最新型疫苗。依疫情需求，配合台灣 CDC 政策實行。

h. 第二劑間隔不得少於一個月或建議可於第六個月施打，並參考仿單資訊及與專業醫師討論。

備註：本表資料彙整國內、外 ACIP, TFDA 及 FDA 之公告與專家共識為主，各疫苗施打詳情可至疾病管制署全球資訊網

(<http://www.cdc.gov.tw>) 「預防接種」專區查詢。新舊疫苗交替之際，以國際現行之疫苗建議之。

